

Folliculite



Papulo-pustule inflammatoire centrée par un poil

Traiter l'infection et éviter la survenue des complications + contrôle de facteurs favorisants (obésité, diabète)

Mesures d'hygiène générales :

- lavages des mains fréquents avec des antiseptiques à la chlorhexidine ou à la polyvidone iodée
- Changement des lames de rasoir
- Éviter la manipulation des lésions
- Utilisation d'une mousse antiseptique
- Soins antiseptiques locaux pluriquotidiens sous forme topique (solution, crèmes, pommades) : chlorhexidine, polyvidone iodée...
- Compresses chaudes

Traitement local :

Désinfection par un antiseptique local (dérivés iodés, hexamidine)

Antibiothérapie locale :

- Acide fucidique crème ou pommade : 1 à 2 applications par jour
- Cycline pommade: 2 à 3 applications par jour
- Sulfamide crème) : 1 à 2 applications par jour
- Érythromycine: 1 à 2 applications par jour
- Clindamycine : 1 à 2 applications par jour

Traitement général : Pas d'indication en dehors des formes compliquées :
Folliculites étendues ou récidivantes
Doxycycline

Pas de guérison

Examen microbiologique direct avec coloration de Gram et mises en culture

Éliminer une infection Gram négative ou à S.aureus résistant à la méthicilline (SARM)