

Pédiculose

Pédiculose de la tête

Pédiculose corporelle

Phthyriase pubienne

Recherche d'une pédiculose chez les sujets contacts

1) Traitement local:

MALATHION lotion 0,5%

1 application raie par raie,
laisser en place 8 heures,
répéter à J7

OU

PYRÉTHRINES si:

- Echec du malathion
 - Patient < 2 ans
- Répéter à J7

2) Décontamination de l'environnement (linge de corps et de la literie)

-Décontamination de l'environnement (linge de corps et de la literie)

+/-

-Rasage si lentes abondantes

+/-

-Traitement local

1) Traitement local de l'ensemble des zones pileuses du tronc et des cuisses

MALATHION lotion 0,5%
1 application raie par raie,
laisser en place 8 heures

OU

PYRÉTHRINES si:

- Echec du malathion
- Patient < 2 ans

2) Décontamination de l'environnement (linge de corps et de la literie)

3) Rasage

Évaluer la réponse au traitement

J2

Présence de poux vivants=résistance

CHANGEMENT DE CLASSE PHARMACOLOGIQUE

Présence de poux vivants=effet lenticide insuffisant

REPRISE DU TRAITEMENT INITIAL

Si échec, rechercher une cause:

- Incompréhension du traitement (barrière du langage)
- Ignorance ou négligence
- Coût des produits non remboursés par la Sécurité sociale
- Réinfestation : mesures associées non réalisées
- Durée et/ou fréquence insuffisantes des applications
- Application d'une quantité insuffisante du produit
- Utilisation d'une forme galénique inappropriée
- Utilisation d'un produit imparfaitement lenticide
- Acquisition de résistances aux insecticides utilisés