

CANDIDOSE

Intertrigos candidosiques

- Traitement antifongique local: lotion, gel, poudre ou crème: 1 application/jour pendant 2 semaines

Privilégier crèmes ou lotions si la lésion est macérée et humide

CICLOPIROXOLAMINE

2 fois par jour pendant 3 semaines

OU

TERBINAFINE

1*j, 1 semaine

OU

Dérivés imidazolés, exemple:

ECONAZOLE

2 fois par jour pendant 2 semaines



Savon neutre ou alcalin pour la toilette

+/-

Antiseptique local non alcoolisé

(Hexamidine aqueuse, Povidone iodée):

si lésion fissuraire ou suintante.

- Recherche et traitement des facteurs favorisants (macération...) et des foyers réservoirs (muqueuse buccale, digestive ou vaginale).

Onyxis et périonyxis candidosiques

• **Traitement local :**

- bains de doigts antiseptiques (exemple : chlorexidine) : applications plusieurs fois par jour, après chaque lavage de mains, d'une solution filmogène
- crème antifongique pendant 3 mois

- Suppression des **facteurs favorisants** (séchage des mains ++)
- Si échec du traitement local ou atteinte de plusieurs doigts :



- **Traitement antifongique général, fluconazole**
-pendant 6 semaines à 3 mois (utilisation hors AMM) après identification mycologique ++