

CANDIDOSE DES MUQUEUSES

Candidose buccale

Chéilite perlèche

Antifongiques locaux et/ ou buccaux

Muguet

Antifongiques buccaux :

- **Nourrisson, enfant :**

-Amphotéricine suspension, 1 cuillère à café/10 kg par 24 heures en 2 à 3 prises (50 mg/kg par jour).

-Miconazole gel buccal, 1 cuillère-mesure (2,5 ml) 4 fois par jour.

- **Adulte immunocompétent**

– nystatine : 4 à 8 comprimés. par jour à sucer ;
– ou amphotéricine B en suspension : 4 cuillères à café en 2 prises quotidiennes ;
- ou miconazole, gel buccal : 2 cuillères-mesure 4 fois par jour

- **Adulte immunodéprimé**

- Associer un traitement local et un traitement par voie générale,
- fluconazole et l'itraconazole
- Cures courtes (5 à 15 jours) et discontinues

Candidose génitale

Vulvovaginite aiguë

- Imidazolés (LP) : 1 ovule intravaginal pendant 1 à 3 jours.
- Association à un traitement antifongique local 2 à 4 semaines
- Toilette avec savon alcalin

Vulvovaginite récidivante ou chronique :

-Traitement préventif par ovule antifongique à libération prolongée une fois par mois

- Si traitement antibiotique, prescrire un traitement prophylactique avec 1 ovule d'imidazolé LP

- Rechercher une candidose chez le partenaire.

-On peut être amené à prescrire un traitement par voie générale

Balanite

-Toilette avec savon alcalin
-Antifongique local imidazolé crème: 2 applications/jour pendant 2 semaines
-Traitement de la partenaire en cas de vulvo-vaginite.