

## Mesures associés

### 1) Identification et prise en charge des sujets contacts

- Au sein d'une famille, traiter les personnes les plus proches du cas avéré même en l'absence de signe clinique

### 2) Traitement du linge et de la literie:

- Lavage en machine à 60°C des linges (literie, serviettes, linges de corps)
- Utilisation d'un acaricide pour le linge ne pouvant être lavé en machine

### 3) Traitement de l'environnement

- Nettoyage simple (aspirateur, lavage) des locaux et du mobilier +/- acaricide (Cf conseils au patient)

### 4) Traitement des lésions associées

- Traitement d'un impétigo (antibiothérapie orale antistaphylococcique et antistreptococcique)
- Soulager le prurit (compresses d'eau froide, émoullients +/- antihistaminique H1 sédatif)

**TOUTE LÉSION IMPÉTIGINISÉE CHEZ UN ADULTE EST UNE GALE JUSQU'À PREUVE DU CONTRAIRE**

## CONSEILS :

- Traiter linge, literie et environnement :
- Lavage à 60°C et séchage à haute température si possible.
- Linge non lavable à 60°C-→ Isoler ce linge dans un sac plastique quelques heures avec spray antiparasitaire sinon quelques jours. Puis lavage classique.
- Hygiène des mains et des ongles ;
- Si traitement local : Bandage ou mouffles pour protéger mains et pieds du nourrisson afin d'éviter une ingestion accidentelle ou des lésions de grattage ;
- Rappeler les modalités d'application, et que le prurit peut persister plusieurs jours après le traitement ;
- Rappeler que c'est une maladie très contagieuse, et que l'enfant peut retourner en collectivité que 3 jours après le début du traitement ; Prévenir les collectivités.