

Pityriasis Versicolor

Macules hypopigmentées ou chamois finement squameuses prédominance au tronc et racine de membres supérieurs , fluorescence verte à la lampe de wood

Rechercher de facteurs favorisants :

- Application de corps gras
- Port de vêtements occlusifs

Lésions localisées:

traitement antifongique local

Lésions étendues :

traitement antifongique oral+
traitement local

KETOCONAZOLE gel moussant 1/j :

-appliquer sur cuir chevelu et corps,
-laisser agir pendant 4-5 min avant de
rincer -Durée 3 jours.

-A renouveler en cas de forme profuse

KETOCONAZOLE crème, 1/j pendant 7
jours

TERBINAFINE (crème ou gel), 1/j
pendant 7 jours

SULFURE DE SELENIUM 2,5% (lotion),
1/jour, 7 jours

CICLOPIROX 1% (crème) 2/j pendant 2
semaines

ECONAZOLE 1% (crème), 1/j pendant 3
semaines

CLOTRIMAZOLE 1% (crème ou lotion)
2/j pendant 1 mois

FLUCONAZOLE 400 mg en dose unique
ITRACONAZOLE 400 mg en dose unique

Si échec du traitement local: traitement antifongique oral

FLUCONAZOLE 400 mg en dose unique
ITRACONAZOLE 400 mg en dose unique

**Si récurrence des lésions, traitement antifongique oral au
long cours :**

**ITRACONAZOLE 200 mg matin et soir, un jour par mois
à réévaluer tous les 6 mois**