

IMPÉTIGO

Conduite à tenir

PEC : TT ambulatoire + Examen de l'entourage

-Mesures générales :
Soins d'hygiène + éviction scolaire
Décision d'antibiothérapie locale ou générale selon la sévérité

Formes peu sévères :

Peu étendu
Surface cutanée < 2% de la surface cutanée totale
< 6 lésions
Absence d'extension rapide

Localisée ou Peu étendue :

Pas de prélèvement bactériologique sauf si :
Formes graves
Récidive
Échec d'un traitement antibiotique bien conduit (staphylocoque méti-résistant)
Pas d'application d'antiseptiques locaux

Formes sévères :

Étendu
Surface cutanée >2% de la surface cutanée totale
Extension rapide
Ecthyma
>6 lésions
Terrain fragilisé
Présence de signes généraux :
fièvre, lymphadénopathie, infection pharyngée
Épidémie familiale

Examens bactériologiques

- **Antibiothérapie locale** : acide fusidique ou **mupirocine** au moins 2 à 3 applications/j, 7 à 8 jours. (La mupirocine est préférée en première)

-Soins associés :

- Lavage biquotidien à l'eau et au savon
- Antiseptiques pluriquotidiens (chlorexidine, solution de Dakin ...), sous forme de pommade en cas de lésions croûteuses.

Évaluer l'efficacité du traitement

Amélioration

Poursuite du traitement

Absence d'amélioration après 48H

► Antibiothérapie générale *per os* associée aux soins locaux dans les formes diffuses 7 à 10 jours :

1^{re} intention : amoxicilline-acide clavulanique 80mg/kg/j

-ou pénicilline M, céphalosporines de 1^{re} et 2^e générations, pristinamycine.

2^e intention :

Macrolide

acide fusidique

Éducation et prévention



- Rappeler les mesures d'hygiène : toilette quotidienne, lavage des mains, ongles courts, vêtements propres...
- Traitement des gites microbiens
- Eviter la macération des lésions (pansements occlusifs, vêtements serrés, couches...).
- Rappeler que l'enfant ne doit pas toucher ou gratter les lésions.
- Informer les collectivités
- Eviter tout contact rapproché avec d'autres enfants.
- Ne pas échanger le linge de toilette ou des vêtements avec les frères et sœurs.
- Le linge, les vêtements, et les objets de l'enfant doivent être fréquemment lavés.
- En cas d'antibiothérapie locale, attendre la guérison complète des lésions.
- En cas d'antibiothérapie générale, l'éviction doit être maintenue 48h après le début du traitement.
- Consultation en Urgence si AEG/ fièvre
- Suivi : Bandelette Urinaire à 3 semaines